

発熱性好中球減少に対する予防的G-CSF製剤使用のための地域連携パス（通称：G連携）2週Ver. 共同診療計画書 医療者用 がんの種類【 乳がん 】 治療内容【 ddEC 】

	施設名称	所在地	電話番号	医師氏名
がん拠点病院	松山赤十字病院	〒790-8524 松山市文京町1番地	089-924-1111	
連携医療機関				

開始時患者状況	患者氏名	患者住所	生年月日	年齢
			年 月 日	歳

受診の目安	
→ 定期診察時・体調悪化時など	
→ G-CSF製剤投与時	

パス開始日	手術日
年 月 日	年 月 日

目標		化学療法連携によるフォローアップ：①予防的G-CSF製剤投与 ②副作用の早期発見と早期対応																															
施設		拠点病院	連携医療機関	拠点病院							拠点病院	連携医療機関	拠点病院							拠点病院	連携医療機関	拠点病院											
受診日		1コース							2コース							3コース							4コース										
		1week							1week							1week							1week										
		1	2	3	4	5	6	7	2week	1	2	3	4	5	6	7	2week	1	2	3	4	5	6	7	2week	1	2	3	4	5	6	7	2week
		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	
治療	抗がん剤投与	●								●								●								●							
	制吐剤・抗生剤の処方	●								■								■								■							
	G-CSF製剤投与		←	●	→					←	●	→					←	●	→						←	●	→						
連携 連絡	患者へG連携を行う事の確認	●								●							●								●								
	副作用発生時の連絡先確認	●								●							●								●								
	情報提供書 拠点病院 → 連携医療機関	●								●							●								●								
	情報提供書 連携医療機関 → 拠点病院		←	●	→					←	●	→					←	●	→						←	●	→						
診療 検査	身長・体重	●								■							■								■								
	採血	血液学的検査	●	←	■	→					●	←	■	→				●	←	■	→					●	←	■	→				
		生化学的検査	●	←	■	→					●	←	■	→				●	←	■	→					●	←	■	→				
	画像	胸部レントゲン	■	←	■	→					■	←	■	→				■	←	■	→					■	←	■	→				
		CT	■								■							■								■							
	臨床所見	SpO ₂																															
		体温																															
		食欲不振																															
		悪心																															
		嘔吐																															
		下痢	●	←	●	→					●	←	●	→				●	←	●	→					●	←	●	→				
		口内炎																															
		全身倦怠感																															
		筋肉痛・関節痛																															
末梢神経障害																																	
高血圧																																	
PS																																	
教育 指導	併用薬チェック	●	←	■	→					■	←	■	→				■	←	■	→					■	←	■	→					
	服薬状況確認	●	←	■	→					■	←	■	→				■	←	■	→					■	←	■	→					
	副作用対策（生活指導）	●	←	■	→					■	←	■	→				■	←	■	→					■	←	■	→					
	服薬指導（保険薬局）	●	←	■	→					■	←	■	→				■	←	■	→					■	←	■	→					
処置等	止痢剤の投与・輸液（下痢）		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■				
	解熱・鎮痛剤の投与		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■				
	制吐剤の投与（悪心・嘔吐）		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■				
備考																																	

注； ●,●必須 ■,■必要時 ←→矢印の期間に実施

発熱性好中球減少に対する予防的G-CSF製剤使用のための地域連携パス（通称：G連携）2週Ver. 共同診療計画書 医療者用 がんの種類【 乳がん 】 治療内容【 ddPTX 】

	施設名称	所在地	電話番号	医師氏名
がん拠点病院	松山赤十字病院	〒790-8524 松山市文京町1番地	089-924-1111	
連携医療機関				
開始時患者状況	患者氏名	患者住所	生年月日	年齢
			年 月 日	歳

受診の目安	
→ 定期診察時・体調悪化時など	
→ G-CSF製剤投与時	
パス開始日	手術日
年 月 日	年 月 日

目標		化学療法連携によるフォローアップ：①予防的G-CSF製剤投与 ②副作用の早期発見と早期対応																																							
施設	受診日	1コース							2コース							3コース							4コース																		
		1week							2week							1week							2week							1week							2week				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7					
治療	抗がん剤投与	●							●							●							●							●											
	制吐剤・抗生剤の処方	●							■							■							■							■											
G-CSF製剤投与			←	●	→					←	●	→					←	●	→					←	●	→					←	●	→								
連携 連絡	患者へG連携を行う事の確認	●							●							●							●							●											
	副作用発生時の連絡先確認	●							●							●							●							●											
	情報提供書 拠点病院 → 連携医療機関	●							●							●							●							●											
	情報提供書 連携医療機関 → 拠点病院		←	●	→					←	●	→					←	●	→					←	●	→					←	●	→								
診療 検査	身長・体重	●							■							■							■							■											
	採血	血液学的検査	●	←	■	→				●	←	■	→				●	←	■	→				●	←	■	→				●	←	■	→							
		生化学的検査	●	←	■	→				●	←	■	→				●	←	■	→				●	←	■	→				●	←	■	→							
	画像	胸部レントゲン	■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→							
		CT	■							■							■							■							■										
	臨床所見	SpO ₂																																							
		体温																																							
		食欲不振																																							
		悪心																																							
		嘔吐																																							
		下痢	●	←	●	→				●	←	●	→				●	←	●	→				●	←	●	→				●	←	●	→							
		口内炎																																							
		全身倦怠感																																							
		筋肉痛・関節痛																																							
		末梢神経障害																																							
高血圧																																									
PS																																									
教育 指導	併用薬チェック	●	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→								
	服薬状況確認	●	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→								
	副作用対策（生活指導）	●	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→								
	服薬指導（保険薬局）	●	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→				■	←	■	→								
処置等	止痢剤の投与・輸液（下痢）		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■					
	解熱・鎮痛剤の投与		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■					
	制吐剤の投与（悪心・嘔吐）		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■		←	■	→			■					
備考																																									

注； ●,●必須 ■,■必要時 ←→矢印の期間に実施