

前立腺がん放射線治療後 共同診療計画書 医療者用

	施設名称	所在地	電話番号	医師氏名	再受診の目安
がん拠点病院	松山赤十字病院	〒790-0824 松山市文京町1番地	089-824-1111(代)		→ PSAが最低値( ng/ml)もしくは、前回値より+2ng/ml以上になったら再受診
かかりつけ医					→ 気になる症状があるとき、定期診察時

  

開始時患者状況	患者氏名	患者住所	生年月日	年齢	バス開始日	診断日	臨床病期	術後病期	バス開始前PSA	グリンスコア
			(明・大・西・平) 年 月 日		年 月 日	年 月 日			ng/ml	

診察日	かかりつけ医(4~12ヶ月より)																																				
	週検	1ヶ月後	2ヶ月後	3ヶ月後	4ヶ月後	5ヶ月後	6ヶ月後	7ヶ月後	8ヶ月後	9ヶ月後	10ヶ月後	11ヶ月後	1年後	1年1ヶ月後	1年2ヶ月後	1年3ヶ月後	1年4ヶ月後	1年5ヶ月後	1年6ヶ月後	1年7ヶ月後	1年8ヶ月後	1年9ヶ月後	1年10ヶ月後	1年11ヶ月後	2年後	2年1ヶ月後	2年2ヶ月後	2年3ヶ月後	2年4ヶ月後	2年5ヶ月後	2年6ヶ月後	2年7ヶ月後	2年8ヶ月後	2年9ヶ月後	2年10ヶ月後	2年11ヶ月後	3年後
	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点

かかりつけ医(4~12ヶ月より)									
3年3ヶ月後	3年後6ヶ月	3年9ヶ月	4年後	4年3ヶ月後	4年6ヶ月後	4年9ヶ月後	5年後		
観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点	観点		
/	/	/	/	/	/	/	/		

項目																																										
目標	再発の早期発見 (PSAが最低値より+2ng/ml以下)																																									
	直腸出血がない・排便刺激がない																																									
	血尿がない・排尿刺激がない																																									
連携	再発、副作用等発生時の連携先確認																																									
	連携の説明(患者用連携バス利用)																																									
処方	○有り( ) ○無し																																									
	○服薬状況確認																																									
指導・指	○併用薬チェック																																									
	服薬指導(保険薬局)																																									
診察・検査	生活支援																																									
	全身症状																																									
	問診	排尿症状・血尿																																								
		疼痛																																								
		排便症状・直腸出血																																								
検査等	末梢血一般																																									
	生化学																																									
	検査等	検尿																																								
	腫瘍マーカー(PSA)																																									

6年目以後は、  
状態を見ながら診療計画をたてます。