




関節もみよう



リウマチ膠原病センター 水木 伸一





関節穿刺

非炎症性関節炎
(関節液WBC<5000)

変形性関節症

炎症性関節炎
(関節液WBC>5000)

グラム染色
培養

+

感染

-

結晶検査

+

結晶誘発性関節炎
痛風
偽痛風

-

CBC, ESR, RF, ANA

反応性関節炎
全身性リウマチ性疾患

単関節炎

関節穿刺

非炎症性関節炎
(関節液WBC<5000)

変形性関節症

炎症性関節炎
(関節液WBC>5000)

グラム染色
培養

+

感染

-

結晶検査


+

結晶誘発性関節炎
痛風
偽痛風

-

CBC, ESR, RF, ANA

反応性関節炎
全身性リウマチ性疾患



単関節炎


化膿性関節炎に対する治療

- ドレナージ
- 抗菌剤治療

	抗菌剤の選択
他の病原菌のリスクなし	第1セフェム
MRSAのリスク (MRSA既往、施設入所者、下腿潰瘍、カテーテル留置者など)	バンコマイシン
グラム陰性菌のリスク (高齢、衰弱、尿路感染合併、腹部手術後など)	広域
淋菌感染疑い (健常、性的に活発)	セフトリアキソン

60歳、女性


体温: 38.1℃
血圧: 121/74 mmHg
脈拍: 97/分・整



V: 圧痛
○: 腫脹

WBC	16,080	TP	6.6	プロカルシニン	3.53
Stab	—	Alb	3.6	RF	11
Seg	87.3	T. Bil	0.7	抗CCP抗体	<0.5
Lym	4.4	AST	15	抗核抗体	<40
Eosino	0.2	ALT	9		
Baso	0.1	LDH	190		
Mono	8.0	AIP	232	細菌学的検査(1):	
RBC	413	γ-GTP	13	静脈血液2セット/2セット:	
Hb	11.6			培養: 陰性	
Ht	35.7	BUN	74.6		
MCV	86.4	Cr	3.54	関節液:	
MCH	28.1	UA	—	塗抹: 白血球1+	
MCHC	32.5	Na	136	培養: 陰性	
Plt	25.3	K	4.3	ピロリン酸Ca結晶: +	
		Cl	100	尿酸結晶: —	
		Ca	—		
尿		CK	80	全身単純CT(1):	
糖	—	HbA1c	73	炎症病巣なし	
タンパク	±			経胸壁心エコー(2):	
潜血	—	CRP	16.80	疣贅なし	
亜硝酸塩	—	C3c	96.0		
白血球	—	C4	10.5		
		CH50	36.9		






大腿骨顆部

60歳、女性

体温: 38.1°C

血圧: 121/74 mmHg


脈拍: 97/分・整



∨: 圧痛
○: 腫脹



WBC	16,080	TP	6.6	プロカルシニン	3.53
Stab	—	Alb	3.6	RF	11
Seg	87.3	T. Bil	0.7	抗CCP抗体	<0.5
Lym	4.4	AST	15	抗核抗体	<40
Eosino	0.2	ALT	9		
Baso	0.1	LDH	190		
Mono	8.0	AIP	232	細菌学的検査(1):	
RBC	413	γ-GTP	13	静脈血液2セット/2セット:	
Hb	11.6			培養: 陰性	
Ht	35.7	BUN	74.6		
MCV	86.4	Cr	3.54	関節液:	
MCH	28.1	UA	—	塗抹: 白血球1+	
MCHC	32.5	Na	136	培養: 陰性	
Plt	25.3	K	4.3	ピロリン酸Ca結晶: +	
		Cl	100	尿酸結晶: —	
		Ca	—		
尿		CK	80	全身単純CT(1):	
糖	—	HbA1c	73	炎症病巣なし	
タンパク	±			経胸壁心エコー(2):	
潜血	—	CRP	16.80	疣贅なし	
亜硝酸塩	—	C3c	96.0		
白血球	—	C4	10.5		
		CH50	36.9		

多関節痛のアプローチ










關節炎 ＝滑膜炎



皮膚
腱



GS:
滑膜肥厚
滑液貯留
骨びらん

PD:
血流シグナル



皮膚

不明熱、症状・所見が多臓器・多系統にわたる疾患

- 感染症（感染性心内膜炎、結核、HIV、梅毒）
- 悪性腫瘍（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、癌の多発転移）
- リウマチ性疾患（関節リウマチ、血清反応陰性関節リウマチ、脊椎関節炎、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎/皮膚筋炎、シェーグレン症候群、ベーチェット病、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症（ウェゲナー肉芽腫症）、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（チャーグ・ストラウス症候群）、巨細胞性血管炎、大動脈炎症候群、血管炎動脈炎：、成人スチル病、リウマチ性多発筋痛症、RS3PE症候群、偽痛風）
- 代謝内分泌疾患（副腎不全、ビタミン欠乏症）

不明熱、症状・所見が多臓器・多系統にわたる疾患

- 感染症（感染性心内膜炎、結核、HIV、梅毒）
- 悪性腫瘍（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、癌の多発転移）
- リウマチ性疾患（関節リウマチ、**血清反応陰性関節リウマチ、脊椎関節炎**、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎/皮膚筋炎、シェーグレン症候群、**ベーチェット病**、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症（ウェゲナー肉芽腫症）、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（チャーグ・ストラウス症候群）、**巨細胞性血管炎、大動脈炎症候群、血管炎動脈炎**、成人スチル病、**リウマチ性多発筋痛症、RS3PE症候群、偽痛風**）
- 代謝内分泌疾患（副腎不全、ビタミン欠乏症）

分類	診断	朝のこわばり	関節痛	発熱	体重減少	ドライアイ・マウス	アフタ	皮疹	光線過敏	レイノー	筋肉痛	しびれ
血管炎	EGPA											
血管炎	EGPA											
血管炎	EGPA											
血管炎	GPA											
血管炎	IgA-V											
血管炎	IgA-V											
血管炎	MPA											
血管炎	MPA											
血管炎	高安											
血管炎	高安											
血管炎	GCA											
血管炎	GCA											
SLE	SLE											
SLE	SLE											
SLE	SLE											
SLE	SLE											
SLE	SLE											
SLE	SLE											
PM/DM	多発性筋炎											
PM/DM	皮膚筋炎											
PM/DM	皮膚筋炎											
PM/DM	皮膚筋炎											
PM/DM	皮膚筋炎											
		45%	83%	35%	43%	35%	57%	78%	10%	9%	43%	30%

EGPA: 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、GPA: 多発血管炎性肉芽腫症、MPA: 顕微鏡的多発血管炎、GCA: 巨細胞性血管炎

【症例 71歳 女性】

【主訴】 多関節痛、背部臀部痛、発熱


【既往歴】 糖尿病、高血圧、脂質異常症

【家族歴】 父胃癌


【現病歴】

9ヶ月前、**発熱・目の腫脹**があり他院眼科で**特発性眼窩炎**と診断されステロイド治療を開始された。PSL2.5mgまで減量された。

1.5ヶ月前から**多関節痛・背部臀部痛**が出現した。
2週間前から発熱も出現するようになり、紹介で当科を受診した。







LOC: ---
HFS

R

L




CTAWP94498

Z: 1


C: 128

LOC: ---
HFS



CTAWP94498
Z: 1
C: 128

LOC: ---
HFS




CTAWP94498

Z: 1


C: 128

LOC: ---
HFS





CTAWP94498
Z: 1
C: 128

LOC: ---
HFS



CTAWP94498
Z: 1
C: 128






LOC: ---
HFS


R

L




CTAWP94498
Z: 1
C: 128

LOC: ---
HFS



CTAWP94498
Z: 1
C: 128

LOC: ---
HFS



CTAWP94498


Z: 1

C: 128

LOC: ---
HFS

R

L




CTAWP94498

Z: 1

C: 128

LOC: ---
HFS



R

L

CTAWP94498
Z: 1
C: 128


脊椎関節炎

付着部炎はないか？


炎症性腰背部痛か？

- ①夜間痛（起き上がることで改善する）
- ②安静で改善しない
- ③運動で改善する

脊椎関節炎 ＝付着部炎




関節リウマチ ＝滑膜炎



アキレス腱 付着部炎エコー

縦断像



横断像



(Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009;68:1520-1527)

72歳、男性。

主訴：肩、手の疼痛


既往歴：前立腺癌OP、虫垂炎OP

家族歴：母膠原病

現病歴：

5日前からから疼痛のため眠れないため、
近くの内科より紹介で初診した。

朝のこわばり：3時間



WBC	7,400	TP	7.2	プロカルシトニン	0.05
Stab	—	Alb		フェリチン	151
Seg	74.0	T. Bil	0.5		
Lym	17.4	AST	15	RF	8
Eosino	1.6	ALT	10	抗CCP抗体	<0.5
Baso	0.4	<u>LDH</u>	216	抗核抗体	<40
Mono	6.6	AIP	278		
RBC	445	γ -GTP	12	MPO-ANCA	<0.5
Hb	13.0			PR3-ANCA	<0.5
Ht	39.5	BUN	18.0		
MCV	88.8	Cr	0.57		
<u>MCH</u>	29.2	UA	4.0		
MCHC	32.9	Na	142		
Plt	32.3	K	4.5		
		Cl	105		
血沈	50	Ca	—		
		CK	80		
<u>尿</u>		HbA1c	5.5		
糖	—				
<u>タンパク</u>	—	CRP	4.71		
<u>潜血</u>	—	C3c	145.8		
亜硝酸塩	—	C4	31.0		
白血球	—	CH50	59.2		

2/Volume 1

S 337

6.50

0.00

50 % PET

3.9/Average

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

$\rho = 0.45 \text{ g/ml}$
 $\mu = 0.00 \text{ g/ml}$

I 664

L
4
9
9

Z: 1

C: 128

W: 256

V=0.72

M=45

2/Volume 1

S 337

0.000000 0.000000 0.000000

6.50

0.00

50 % PET

3.9/Average

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM
m=0.00 n=6.50 g/ml

I 664

L
4
9
9

Z: 1
C: 128
W: 256

V=1.05
M=46

2/Volume 1

S 337

6.50

0.00

50 % PET

3.9/Average

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

$\rho = 0.00$ $\rho = 0.50$ g/ml

I 664

L
4
9
9

Z: 1

C: 128

W: 256

V=1.39

M=49

S 337



me 1

A 250

402/83



0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

m=0.00 n=0.50 g/ml

P 250

-999999.000000

L
250

Z: 1
C: 128
W: 256

M-83

me 1

A 250

402/91



0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

m=0.00 n=0.50 g/ml

P 250

-999999.000000

L
250

Z: 1

C: 128

W: 256

M: 91

me 1

A 250

402/93



L
250

0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

m=0.00 n=0.50 g/ml

P 250

Z: 1
C: 128
W: 256

-999999.000000

M-93

me 1

A 250

402/227



0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

m=0.66 H=6.50 g/ml

P 250

-999999.000000

L
250

Z: 1
C: 128
W: 256

M: 227

me 1

A 250

402/238



0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM
A: 238 of 299
m=0.60 H=6.30 g/ml

P 250

-999999.000000

L
250

Z: 1
C: 128
W: 256

M: 238

me 1

A 250

402/246



0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

3.3mm /3.4var.sp
m=0.60 H=6.50 g/ml

P 250

-999999.000000

L
250
0

Z: 1

C: 128

W: 256

M: 246

me 1

A 250

402/264



0.00

50 % PET

3.3/

3.3mm /3.4var.sp

10:47:09 AM

m=0.60 H=6.50 g/ml

P 250

-999999.000000


L
250
0

Z: 1

C: 128

W: 256

M: 264



リウマチ性多発筋痛症暫定分類基準


(ACR/EULAR 2012)

前提条件

50歳以上、両肩の痛み、CRPまたは血沈上昇

スコアリング

項目	エコーなし	エコーあり
朝のこわばり(45分を超える)	2	2
殿部痛または動きの制限	1	1
RF陰性、抗CCP抗体陰性	2	2
肩と腰以外の関節症状がない	1	1
エコー所見		
肩および股関節の滑液包炎		1
両側肩の滑液包炎		1
	4点以上	5点以上



【症例 78歳 女性】

【主訴】 多関節痛, 上下肢疼痛

【既往歴】 糖尿病(H22～)

近視性網脈絡膜萎縮変性(20年前～)

高血圧

脂質異常症

心房細動

再発性単純性ヘルペス

掌蹠囊胞症


【家族歴】 特記事項なし

【生活歴】 飲酒歴: なし、喫煙歴: なし

【現病歴】

平成27年9月両手・右下腿浮腫出現し近医で心腎病変精査されたが異常所見認めなかった。



同時に多関節炎を認めたためRS3PE症候群と診断されPSL 10mgで加療開始された。症状改善に伴い以後急速に減量され同年11月末には内服中止となっていた。その後12月13日に症状が再燃したためPSL 2.5mgで加療再開後精査加療目的に12月22日当科入院となった。



V: 圧痛
O: 腫脹





入院時検査

(血算)		(生化学)		(感染症)	
WBC	12610 /uL	TP	6.5 g/dL	PCT	0.25 ng/mL
Neutro	84.9 %	Alb	2.98 g/dL	QFT	(-)
Lymph	7.7 %	BUN	14.6 mg/dL	β-Dグルカン	(-)
Mono	6.0 %	CRE	0.64 mg/dL	RPR-1	(-)
Eosino	1.0 %	UA	4.2 mg/dL	TPHA-1	(-)
Baso	0.4 %	T.Bil	0.7 mg/dL	HBsAg	(-)
Hb	9.8 g/dL	AST	48 U/L	HCVAb	(-)
MCV	82.3 %	ALT	35 U/L		
MCHC	32.3 %	LDH	277 U/L	(免疫)	
Plt	37.8 x10^4/uL	ALP	726 U/L	C3	195.3 mg/dL
		γ-GTP	75 U/L	C4	35.6 mg/dL
(凝固)		CK	18 U/L	CH50	56.6 /mL
APTT	28.5 sec	CRP	14.98 mg/dL	IgG	1167.8 mg/dL
PT-INR	1.12 INR	Na	138 mmol/L	IgM	81.1 mg/dL
PT(%)	76.5 %	K	3.3 mmol/L	抗核抗体	(-)
D-dimer	46.05 μg/mL	Cl	94 mmol/L	MPO-ANCA	(-)
血沈1h	96 mm	Ca	8.7 mg/dL	PR3-ANCA	(-)
		Glu	142 mg/dL	RF	14 IU/mL
便潜血	1000 ng/mL以上	BNP	80.1 pg/mL	抗CCP抗体	0.7 U/mL
		ferritin	880 ng/mL	MMP-3	918.7 ng/mL



肩関節エコー


リウマチ性多発筋痛症を疑う所見




手指関節エコー

関節リウマチを疑う所見



右



左





側頭動脈



正常像

椎骨動脈



(UpToDate)



項目

1. 発症年齢: 50歳以上
2. 新たな頭痛: 初めて経験する、あるいは経験したことのない局所性頭痛
3. 側頭動脈異常: 頰動脈の動脈硬化と関係のない側頭動脈に沿った圧痛あるいは脈拍減弱
4. 赤沈値 50mm/H以上
5. 動脈生検の異常: 単核細胞浸潤あるいは肉芽腫性炎症が著明、通常巨細胞を伴う血管炎所見




上記5項目中3項目以上が認められる場合に診断する。

巨細胞性動脈炎の診断基準 (Arthritis Rheum 1990)

右



左




側頭動脈縦断

0M

1M

6M



まとめ

目と手と、
最新の検査技術を使って
関節→そして全身をみよう。